# 洗冤録

坤

## 屍傷雜說

凡驗病死之人須先問本人来自何處幾時到来有無熟人識認原患是何疾病年歲若干病幾日身死若是奴婢則先討契書看問有無親戚曾請是何醫人喫甚藥問明因由然後對衆証定如別無他故只取檢狀聲明適身黃色骨瘦委是生前因患是何疾致死仍取醫人驗狀紙如果衆証因病身死分明既不是非理致死不須請復驗

凡因病死者形體羸瘦肉色痿黃口眼多合腹肚低陷兩眼通黃兩拳微握髮髻解脫身上或有新舊針

灸瘢痕餘無他故是因病死

凡患病求乞在路死者形體瘦弱內色痿黃口眼合

兩手微握口齒焦黃唇不蓋齒

或疾病死值春夏秋初經隔兩三日肚上臍下兩脇

肋骨縫有微青色此是病人死後經日寖動腹內穢

汚發作攻注皮膚致有此色不是生前有他故

邪魔中風猝死屍多肥肉色微黃口眼合頭髮緊口

內有涎沫遍身無他故

猝死肌肉不陷口鼻內有涎沫面色紫赤蓋其人未

死時涎壅於上氣不宣通故如此

猝中死眼開睛白口齒閉牙關緊閉有口眼喎斜并
口兩角鼻內涎沫流出手脚拳曲
中暗風屍必肥肉多黃白色口眼皆開涎唾流溢猝
死於邪祟其屍不在於肥瘦兩手皆握手足爪甲多
青或暗風如發驚搐死者口眼多喎斜手足必拳縮
臂腿手足細小涎沫亦流出
傷寒死遍身紫赤色口眼開有紫涎流出唇亦微綻
手不握拳
冒時氣死者口閉眼開遍身黃色畧有薄皮起手足
俱伸

斑疹死皮肉上只有星點紅斑痕而不甚浮腫

中暑死多在五六七月眼合舌與糞門俱不出面黃白色　亦有鼻孔及糞門有血出者

凍死者面色痿黃口內有涎沫牙齒硬身直兩手緊抱胸前（一說項縮脚拳）檢時用酒醋洗火得熱氣則兩腮紅面如芙蓉色口有涎沫出其涎不粘

餓死者渾身黑瘦硬直眼閉口開牙關緊禁臍肚低塌手足俱伸

驚死者目瞪口開兩手舒展猶若怕怖之狀

凡驗酒食醉飽致死者令仵作用醋湯洗檢在身如

無痕損以手拍死人肚皮膨脹而響者即是因食飽腹脹酒醉心肺致死仍取屍親供狀死人生前常喫酒多少致醉及現今喫酒多少數目以驗致死因由○如或吐瀉瘦弱皮膚微黑不破裂口內無血面唇指甲不青糞門不腫突乃是飲酒相反之狀

燒酒醉死者牙齒動揺欲落屍軟弱不硬口鼻間有血水流出○燒酒不可以錫器盛灺及過宿倘為日稍久飲之則能殺人其人之面多青黯

昔有人燒酒醉後復用炕而死者又有人醉燒酒身頻畏寒以綿被厚蓋之而死又有人醉燒酒索飲冷水數碗而死或曰冷水徐飲可以漸引大毒外達若連飲過多熱毒為冷所遏无由透達故閉厥不救

凡酒食醉飽後被築踏內損死者其狀甚難明若屍別無他故惟口鼻糞門有飲食並糞帶血流出驗此等屍須仔細體究曾與人交爭因而等踏見証分明方可定狀一說其屍遍身微紅口眼俱開兼有血出兩手握肚腹脹

鍼灸死者須另勻醫人驗鍼灸處是否穴道有無錯誤致死因由

五臟之氣已絕於內而用鍼者反實其外是謂重竭重竭必死其死也靜臟氣已絕於內陰虛也反宗其外誤益陽也益陽則愈損其陰是重竭也陰竭必死死則靜也

五臟之氣已絕於外而用鍼者反實其內是謂逆厥

逆厥必死其死也躁臟氣已絶於外陽虛也反宗其內誤補陰也助陰則陽氣愈竭故至四逆而厥逆厥必死死必躁也

凡男子作過太多精氣耗盡脫死於婦人身上者真偽不可不察真則陽不衰偽者則痿

昔有人暱一婢而脫者斂時啓所蓋被異香四發此因眠房藥多麝臍通透之品故也夢中脫死者男則陽不衰女則陰必洩屍俱有笑容

男女因陰陽症死者唇及指甲多青黯甚或遍身皆紫乃氣絶血凝之故

陰症死者屍青黑黯似毒死形而色微淡口眼合兩手握陽縮小餘精流出

凡受杖而死者須驗所受杖處瘡痕濶狹看外腎并陰囊婦人陰門并兩脇肋腰小腹等處有無血瘀痕

小杖痕左邊横長三寸濶二寸五分右邊横長三寸五分濶三寸各深三分

大杖痕左右各方圓三寸至三寸五分各深三分各有膿水兼瘡遇迴亦有膿水淹浸皮肉潰爛去處

杖後有因他故死者若兩腿面及小腹有微紅色勿以曾經受杖便作血瘀傷痕蓋受杖時按捺在地或被硬物砸傷死後自然發現臨時務須分別

兩臀上各有破傷斜長幾寸濶幾分深至骨上有血

痂委是受杖決因風透患致命身死

凡從樹及屋臨高跌死者看枝柯掛絆所在并屋高低失脚處踪跡或土痕高下及要害處須有抵癮或物磕擦痕瘢若內損致命者鼻耳鼻內定有血出若傷重分明更當細驗之仍量撲落處高抵丈尺

跌者從高而下或失足或自絆其力在下則所傷多在腿足及臂膊然其或左或右又皆止傷半邊如係人推而跌者則其力在上所傷多在頭面及兩手腕蓋推之力大而人之一身其最重莫如首推而下之勢必自顧或兩手先至地或出於不知則頭面必先

倒斃而下雖亦未必全傷而所傷與自跌者不同

凡被塌壓死者兩眼突出舌亦出兩手微握通身死血淤紫黯色或鼻有血或清水出傷處有血瘀赤腫皮破處四畔赤腫或骨并肋皮折折壓着要害致命如不壓着要害不致死或死後壓即無此狀

凡舍屋及墻倒或石頭脫落壓死者其屍沿身虛怯要害處若有痕損須聲明長濶分寸作堅硬物壓痕仍着骨損與不損若樹木壓死要看所倒樹木斜傷着痕損分寸死後壓者亦無此狀

兩人共擡一物一人力大驟為擡起一人力小被壓

則所壓之肩窩及相對之手足必俱有傷如誤觸而壓傷者當辨其前後左右如被壓於後則前有跌磕微傷被壓於前則後有跌磕微傷左右亦然

凡外物壓塞口鼻出氣不得以致身死者眼開睛突口鼻內流出清血水滿面血瘀赤黑色糞門突出及便溺污衣服等件

凡被人衣服或濕紙搭口鼻死則腹乾脹

被他物壓塞而死者其兩手外膊不拘上下兩足後骨並心肖之前俱各有微傷方是蓋悶至睛突壓之必重身雖不能展動未有併手足壓定不能稍動者

如或併縛其手足則亦當驗手足有無束縛傷痕

或有將人飲醉厚其氊褥挾令横卧俟其睡熟然後將氊褥捲而束之倒立片時即死者並無口眼血出諸跡即或微有淨洗即無而酒氣倍為薰蒸一說大腹小腹皆平弱而無脹形口又按讀律俗觸云凡脹在兩肋及心肯之前按之堅凉擊之無聲者即是若檢骨則傷在頂心兩足心骨

有以高桶二隻疊而合之約如人身之高下以下桶貯水令滿八石灰數升攪渾將人倒入水中再以所合之桶蓋上片時即死名曰淤湖其人死後用水洗淨毫無傷跡面色微黃而白一如病死雖云有血倒

出然見灰氣即回而血之應凝滯於面者得灰盡解此若非檢骨則不得其實檢骨之法必在腦殼之內蓋灰滓從口鼻而入口鼻雖可淨洗而從臭灌者直入於腦灰最沉滯腦內必多灰滓以此為驗自無所遁

凡被硬物瘾疹音閃死者肋後有瘾疹着紫赤腫方圓三寸四寸許皮不破用手揣捏着筋骨傷損此為虛怯要害致命處

凡被馬踏死者屍色微黃兩手散頭髮不慢口鼻中多有血出痕黑色被踏要害處便死骨折腸臟出若

只觸倒或踏不着要害處即有皮破瘀赤黑痕不致死　驢足痕小牛角觸着處多在心頭脇前或在小腹脇肋若皮不破傷亦赤腫○牛角傷痕小而深者方是

人馬驢騾踏傷者有緩急叢亂之分總以傷之多寡輕重為辨馬馳力大所傷處小傷必骨折或腸臟出擁擠仆地而踏傷必多但不似馳騾者之力重而折甚人踏傷成片而長一頭重一頭輕叢踏不起者則輕重長短不一驢騾踏傷不獨較小於馬其傷之暈凝聚成形牛觸係不知而騾攖者傷多在前兩肋之半小腹及心脇若牛佚而奔方避之而不及則受傷

多在脊背及肋之左右

凡被車輪椦死者其屍肉色微黃口眼開兩手微握頭髻緊速死者屍狀如此經數日死者異是

凡車輪頭椦着處多在心頭胸前并兩脇肋要害處便死不是要害不致死

車有橫輦直輦之分橫輦者十字路口人從橫過車行急驟不及挽回其人跌仆被輦而死則或項或首或心胸背脊肋腹或手膊腿足各有徑過傷如係對面迎輦者其傷或手足或脇肋却皆或左或右俱在半邊直而徑過其傷必長却多在仰面若人在前行

車從後至傷亦如之但屬在背居多

凡被雷震死者其屍肉色焦黃渾身軟黑兩手拳散口開眼皶（音脫皮剝也）耳後髮際焦黃頭髮披散燒著處皮肉緊硬而攣縮身上衣服燒爛或不燒傷損痕跡多在腦上及腦後腦縫多開裂髮如燔火燒焦從上至下時有手掌大片浮皮紫赤肉不損胸項背膊上或有似篆文痕跡雷有震擊二項震者被驚而死無傷擊則有傷痕

衡陽人某被雷擊死身首俱無燒痕惟左足大指上如斜刺一孔甚深自脚心起至膝上焦黃如矢亦无篆字文

凡被虎咬死者屍肉色黃口眼多開兩手拳握髮髻散乱糞出傷處多不齊整有舌舐齒咬痕跡

虎咬人多咬頭項上身上有爪痕搯泓上舛損痕傷處成窟或見骨心頭胸前臂腿上有傷處地上有虎跡勒畫匠畫出虎跡并令村甲及傷人處地隣為証。虎咬人月初咬頭項月中咬腹背月終咬兩足猫咬鼠亦然

凡被廟狗傷死者傷處必有痕跡腹脹硬陰莖挺出其毒發之時如感冒風寒之狀畏風特甚時作狗聲每欲齧人及衣物小腹墜脹小便難

凡被蛇蟲傷致死者其被傷處微有齧損黑痕四畔

青腫有黃水流毒氣灌注四肢身體光腫面黑
死後被蟲鼠傷者皮破無血破處遍圍有齧痕踪跡
有皮肉不齊處若他物咬則痕跡粗大
道路死屍地方申報即行相驗明白開造有無傷痕
約畧年紀填註面皃衣服如有攜帶行李財帛眼同
鄰甲公驗貯庫以俟親人認領買棺殮封培土暫埋
標立記號若係兇死之屍尤必斟酌申報

## 論中毒

凡可以致人於死者非獨砒鴆為然而參附為尤甚日夕服之不置以致口鼻流血膚為寸裂而死岐黃書中更有青筋脹一症即俗所謂烏沙脹倘誤認為陰症而投之以藥則斷手不救凡此等症候及陰症之不救者兩手足指甲皆青黯或盡青紫甚則頭面及遍身皆紫黯緣其血敗積而成色故也又閩粵多瘴癘凡為瘴癘所中之人急令人以磁鋒代刺或於額上或於眉棱或於兩臂腨立出血升餘則瘥病淺者血紅而多病深者血紫而少若紫黑而極少則病

甚深乃倖而僅救者耳士人每以得血稱賀如或不得血或得之艱澁則咸知不治及其死也其屍頭面或多青黯或盡紫黑其手足指甲亦然又肺癰腸風及中臟諸症未死之前吐出惡物或瀉下黑血穀道腫突或大腸突出等項豈可盡視為中毒之驗邪且如日用飲食中其物性相反誤食而死者更復不少即如生葱不可見蜜河魨不可見甲灰之類苟因其死之暴而狐疑以推之則大謬矣

滇粵等省受瘴癘身死者頗多其屍不盡青紫黑黯亦有面色紅赤唇口紫黑胸腹咽喉脹滿手足指甲

俱青黯口眼耳鼻并糞門小便處所亦間有血出若
死後檢骨亡多青暈色
毒有自外入而非飲食致者如蟲蛇等毒物傷則皮
上有齧損痕若狂犬傷瘡乾後死亦有齧痕但分大
小耳各所傷處但青黑腫
凡中毒屍骸潰爛檢骨則骨上下黯黑色胸膛心坎
牙根十指尖骨俱青色

## 服毒死

凡服毒死者口眼多開面紫黯或青色唇紫黑手足指甲俱青黯口眼耳鼻間有血出甚者遍身黑腫面作青黑色唇捲發皰舌縮或裂折爛腫徹出唇亦爛腫或裂折指甲尖黑喉腹脹作黑色生皰身或青斑眼突耳鼻口內出紫黑血鬚髮浮亂

未死前須吐出惡物或瀉下黑血穀道腫突或大腸突出（服毒多而速死者形狀始有此）

凡服毒死或即時發作或當日早晚若其藥慢或一日二日方發或嘲吐或吐不絕仍須於衣服上尋餘

藥及死者坐處尋藥物器皿之類

驗服毒用銀釵皂角水揩洗過探入死人口內以紙密封良久取出作青黑色再用皂角水揩洗其色不去如無其色鮮白人既死雖非服毒未免有穢故銀釵亦作黑色但洗之即去也惟真中毒雖洗數次其色青黑不能鮮白

按毒藥身者事多暖昧全憑銀釵定驗虛實銀釵假偽一觸穢氣其色即變難以辨明若臨事取辦於民則情弊多端必須令工匠用足色銀成造以官對押試驗鑿記封收專為驗屍需用亦絕究盡之一端也

又一法用大米或粘米三升炊飯用精糯米一升淘洗訖用布袋盛就所炊飯上炊蒸取鷄子一箇鴨子亦可

細破取白拌糯米飯令勻依前袱起着在前大米粒
米飯上以手三指緊握糯米飯如鷄子大毋令冷急
開屍口齒外放着及用小紙三五張搭遮屍口耳鼻
臀陰門之處仍用新綿絮三五條釅音念醋三五升用
猛火煎數沸將綿絮放醋鍋內煮半時取出仍用醋
盤罨屍却將綿絮蓋覆若是死人生前被毒其屍即
腫脹口內黑臭汚汁自然噴來綿絮上不可近後除
去綿絮糯米飯被臭惡之汁亦黑色而臭此是受毒
藥之狀如無則非也
又一法將白飯一塊八死人口中喉內用紙蓋一兩

時辰取出飯與鷄吃鷄亦死即是

有空腹脈毒惟腹肚青脹而唇指甲不青者有食飽後脈毒惟唇指甲青而腹肚不青者又有腹臟虛弱老病之人畧脈毒而便死腹肚口唇指甲並不青者却須參以他症驗虛弱老病人先以銀釵探喉中如果色變還作脈毒論其後方以他症參之須詳審此人未死前有何病症虛損等情

有脈毒已久蘊積在內試驗不出者須先以銀釵探入死人喉訖却用熱糟醋自下罨洗漸〻向上須令氣透其毒氣薰蒸黑色始見如便將熱糟醋自上而下則其熱氣逼毒氣向下不復可見或就糞門上試

探則用槽醋當反是

服毒中毒若生前喫物壓下八腸臟內試驗無証即

自穀道內試其色即見

服毒辨生前死後

生前中毒遍身作青黑多日而皮肉尚有亦作黑色

若經久皮肉腐爛見骨其骨黯黑色胸膛心坎牙根

十指尖俱青色

死後將毒藥置口內假作中毒皮肉與骨只作黃白

色

有本是中毒輙驗稱服毒者宜仔細辨之

## 諸毒

中蠱毒者遍身上下頭面胸心並深青黑色肚脹或口內吐血或糞門溺血

造蠱者取百虫置皿中經年開視有一虫盡食諸虫而獨存者為蠱故字從蠱從皿也能隱形似鬼神其毒不一皆疫乱元氣多因飲食行之

南方有蠱毒之鄉於他家飲食即以犀角攪之白沫蹙起即為有毒無沫者即无毒令病人吐於水內沉者是蠱浮者即非或令含黑豆頭脹皮脫者是蠱豆不脹皮不脫者即非

中金蠶毒死屍瘦劣遍身黃白色眼睛塌口齒露出上下唇縮腹肚塌將銀釵驗作黃浪色用皂角水洗不去

金蠶蠱毒之巧者服之而死與病死者無異但銀釵上黃浪色洗之不去此金蠶之色也

又有身體脹皮肉似湯火皰起漸次為膿舌頭唇吳皆破裂乃是中金蠶毒之狀上言瘦人此言肥人

金蠶一名食錦虫虫屈如指環食故緋帛錦如蠶之食葉滇蜀湖廣閩粵皆有奸人畜之取其糞置飯食中毒人人即死蠶得所欲則日置他財使人暴富然遣之極難水火兵刃都不融害必倍其所置金銀錦物置蠶於中投之路傍人偶收之蠶隨而往謂之嫁金蠶不然入人腹殘齧腸胃死而後出也

粵西有蠱思蠱狀似雞虫如蠶豆大能變幻作小後形遺嫁之法彷彿金蠶

中鼠莽草毒江南西有之亦類中蠱毒加之唇裂齒齦青黑色此毒經一宿一日方見九竅有血出

莽草本作兩人以毒鼠故名鼠莽食之令人迷閉南中川蜀以及上谷皆有之木若石楠葉稀

經花一說藤生絞石間是名兩草

中巴豆毒口乾兩臉赤五心煩熱痢不止

中砒霜毒得一伏時遍身發小疱作青黑色眼睛聳出舌上生小刺疱綻出口唇破裂兩目脹大腹肚膨脹糞門脹綻十指甲青黑

中砒霜毒吐逆腸腹絞痛不可忍發狂七竅迸血口唇亦青黑色若飽時脈上一半青饑時脈下一半青外腎脹大

砒石出信州玉山有砒井故亦名信又隱信字等人言此井官封禁取甚嚴然他處出銅錫之山往往有之生者名砒黃赤色毒後以大蒜之令烟上着器凝結作白霜者名砒霜毒尤熱烈

若遇酒及燒酒尤腐爛腸胃頃刻殺人

中鉤吻毒百竅流血狀如砒霜畧同

鉤吻即野葛因入口鉤人喉吻故曰鉤吻廣人謂之胡蔓草又曰斬腸草滇人謂之火把花岳州謂之黃藤其草近人則葉動蔓生葉圓而尖春花甚嫩毒甚秋冬草枯稍緩五六月間花似櫟柳花數十朶作穗嶺南花黃滇南花紅

中冰片毒熱酒服冰片錢許則正氣散亂血脉沸騰七竅流血而死

龍腦一名

中水銀毒身死者以黃金驗之色白者是

食果實金石藥毒者其屍上下或有一二處赤腫有類拳手傷痕或成大片青黑色爪甲黑身體肉縫微

有血或腹脹或吐瀉血

中酒毒腹脹或吐瀉血

中藥毒菌音郡葷淨音毒手脚指甲及身上青黑色口鼻

內多出血皮肉多裂舌與糞門皆露出

脹銀鈎死檢驗傷痕法各書中具無載

按銀鈎性主腐爛皮肉令人每用以去瘡此物投入腸胃非比砒藥諸毒性烈脹之即口眼臭竅流血居齒豁裂指甲青黑現有外傷可以檢驗係粘入腸胃漸二腐爛令人如患病狀或半月一月而死却无外現傷形又金銀圓光无鋒芒者入腹可下藥煎碎失稜角住腸胃能令人斷腸而死亦无外傷可以檢驗此種人命既無檢驗之法姑闕疑以俟留心體察

脹鹽滷死者髮乱手指甲禿胸前有爪傷痕因痛極

不可忍徧地滾跌自抓搔音却所致

眠滷死者身不發皯口不破裂腹不膨脹指甲不青

釵探不黑頻有黯色洗之即白遍身黃兩眼合口中

或有涎沫但其屍雖發變心肺不爛取汁煎之猶能

成鹽

眠澣衣所用灰汁死者有乘人病時以灰汁煎藥毒

之致死者髮亂指甲禿身拳曲口鼻有血

中莨音郎菪毒悶亂如猝中風或似熱感狂病一名水莨菪葉

圓而光誤食令人狂亂或吐血

中苦杏仁毒西北諸省有苦杏仁生熟眠之都不為

害畧用火炙仍令半生服數十粒即能死人其屍眼閉舌唇耳竅手足十指俱青色腹肚有青色塊每有食以詐人者人不易防最難禁化惟急取吐吐出可解

中草烏頭毒江左山南有草烏頭其汁煎之名射罔俱大有熱毒而射罔更烈塗破傷損處立能殺人

中鴆鳥毒南海有鴆鳥似鷹而大壯如鶚紫黑色赤喙黑目頭長七八寸雄名運日雌名陰諧食蛇及橡宗蛇入口即爛其屎瀋着石石皆黃爛飲水處百蟲吸之皆死巢於大木之顛其下數十步草不生人誤食其肉立死惟得犀角其毒即解

# 意外諸毒

## 莧鱉併食毒

昔有人將鱉與莧併食之遂病死屍未殮忽小鱉無數自九竅湧出散走馬厩中唯遇馬溺者輒化為木又有人誤食鱉莧飲馬溺得瘥或云白馬溺尤良

## 食驢肉喫荆芥茶殺人

本草昔有人啖黃魚羹罷抹荆芥如茶而飲少頃足低竒庳上徹心肺跣行沙中馳走如狂延史皆破欲裂急救解毒藥飼之兩日乃止

荆芥一名假蘇本草謂性溫不然宗穢涼數見食黃頷魚偶犯荆芥者必立死甚於鈎吻毒

## 茅舍漏滴肉上食之殺

## 蜜鄭併食毒

韶州月華寺側民家設僧供新蜜方熟羣僧飽之有某院長老兩人還至半道遇村墟賣鄭買

食盡半斤至夕皆死

## 河魨風藥並食毒

昔有人招友晨餐者烹河魨為饌友以故不食遺飯餉妻亡方平明服藥不以為慮啜之甚美即時口鼻流血而絕

食物變改及食禁○按禽獸虫魚之屬或有感沴氣而生形質變異者如獸有歧尾蟹有獨螯羊一角鷄四足是也○物有形色變異者如白烏烏首烏鷄白首白馬青蹄白馬黑蹄是也○有形色無異其肉變怪者如落地不沾灰塵經宿肉體尚暖曝炙不燥入水自動之類是也○有皮肉無異腸臟變改者如肝

色青黯腎氣紫黑魚無腸膽牛肝葉孤之類是也○
有一物常食性善與他物相半過口而害人者如鮠
魚同鹿肉食之殺人羊肉同鱠酪食之害人羊肝得
生椒破人臟猪肉得胡荽（音雖）爛人臍是也○有一物
常食性平與他物相感入腹成動物者如鱠生同酥
乳食之變諸虫鱉肉與荳茅食之還生鱉牛肉同猪
肉食之成寸白虫猪羊肉以柰楮柴煮炙食之亦成
寸白虫也

飲蛇遺水毒

胡卅陳某因步春渴掬澗水咽之數日覺心腹
微痛日久疼甚醫診之云心脾受毒今心脉損

甚陳語其故醫曰蛇遺不淨在澗子誤飲其水蛇已成形在腹食心而痛也遂以水調雄黃服之果不赤蛇數條皆能行

## 飲瓶花水毒

宋汪待舉字懷中守处州郡部民有飲客者客醉卧於空室中夜醒酒渴索漿不得乃取花瓶水飲之次早啓戶客死矣其家訟於官待舉究舍宇所有物惟瓶沉旱遭而已細鞫之訟乃白

（一云瓶浸蝎梅）

## 食三足鼈毒

太倉州民道見溲者持一鼈而三足買歸令婦烹之既熟時婦共飡婦不欲食出自門外久不聞其夫舁入視已失所在地上止存髮一縷衣服冠履事亡皆在如蛻形者驚怖呼喚里甲以婦為謀殺夫而訴諸也官為鞫之得其情乃原婦罪

## 草藥夾雜毒草

英州傳其往州南三十里掃塔有客舡自番出至舟中土人携一僕亡病脚弱不能行舟師憫之曰吾有一藥治此病如神既賽廟畢飲服頻醉乃入山收藥漬酒授病者其藥八口腸胃即痛如刀割遲明而死土人咎舟師舟師恚即取所餘藥自漬酒服之不踰時亦死蓋山多斬腸草人食之輒死而舟師所取藥為根蔓所纏結不暇擇徑投酒中是以及於禍則知草藥不可妄服也

## 食物過荆林毒

肇縣有田作者其婦餉之食畢死翁姑曰婦意也陳於官不勝革楚遂誣服是時天久不雨許其時官山東曰獄其有寃乎乃親歷其地出獄曰徧審之至餉婦乃曰夫婦相守人之至願鴆毒殺人訐之至客者也焉有自餉於田而鴆之者於遂詢其所饋飲食所經道路婦曰魚湯來

飯度自荆林無他異也許乃買魚作飯投荆花於中試之狗亂無不死者婦寃遂白即日大雨如注

## 鷄毒

昔有蘇人出商於外其妻畜鷄以待其歸數年方及殺鷄食之夫即死鄰人疑有外姦首之太守鞫之无他故後細察其由獄首白蓋雞食蜈蚣百虫久則蓄毒食之殺人故養生家鷄老不食又夏不食鷄

## 黃蠟炒鷄人食之脹悶氣塞三日而死他毒可驗此毒死如平人絕無可驗亦無可救法

按辟穀諸方每有用黃蠟者云食之不飢亦須解下然後可喫他物解之之法用青茅湯或冬葵子湯飲一二碗葉則解下依然未化也若未解時止可飲清水凡有質有味者俱不可食食

之必甚脹滿然則黃蠟狀鷄之毒或亦前物可解乎或麻油大麻子汁茭茉湯汲茭茉湯亦可解乎又黃蠟能斂氣不散故凡丸藥之珍貴者以蠟裹之可久貯不壞今中此毒者口鼻等竅自當無血水流出但既脹悶而死必有眼凸脣凸糞門凸腹膨脹等狀可驗或屍已腐當視其腸胃必有蠟鷄未化似宜取出洗去他穢以水煑之蠟浮水面候冷自凝成片仍作黃色此亦似屬可驗者乎

## 鱔毒

鈆山縣有賣薪者性嗜鮮一日自市故飢甚妻烹鮮以進恣啖之腹痛而死鄰保謂妻毒夫執送官拷訊無據械繫踰年縣令閱其牘疑中鱔毒召漁者捕鱔得數百斤悉置水甕中有昂頭出水二三寸者數之得七令異之知為他物所變其毒必甚細為鞫究婦冤始白

## 守宮毒

鷺蟄後至九月凡蓄水在几上經宿者雖渴甚不可飲因守宮之性見水則淫每於水內相交餘瀝遺入為性最毒如誤飲時急覓地漿水解之或吐或瀉尚可拯救一二

## 衣有暑毒

夏日汗透衣切不可於烈日中曬若將乾忽暴雨將至急為收納則烈日之毒即錮於內如遇酷暑汗出時偶一衣之則暑以引暑其毒立中症候全類傷寒若誤作寒治必至發狂譫語再設投參芪桂附湯以益陽未有不至口鼻流血不已者

有婦曰聞淀兒自速至更衣見之時方冬月凡所更衣皆夏日所暴而藏者婦方有娠胎為暑毒所中激而生煩腹痛脈伏熱極似寒諸醫說詔中寒參附併投病益煩悶而死

## 空屋邪氣毒

方屋園林久閉其中毒氣最盛切莫急入蓋久閉屋舍陰曀朝沴濕毒閉結不散甚或孤淫邪

賭。備以溜蹤蛇虺惡獸涎而盤踞若夫園林深秘恐更有異物潛身必大其聲勢或先之以火驚而散之使其預匿以免猝遇相傷也

## 蛇虺涎毒

凡年久臺榭池館藤蘿花樹蓊鬱之下不可恣意烹飪恐為毒中前朝閩中一田姓卿紳得一園亭掃除初就即宴邑令于園中其時盛夏蓮花正茂飲將午夜席未及半邑令忽瞋目不語疑為沉醉急扶舁回入。署未幾而殂且縣所有蠱因閩傳邑侯為本紳所毒事聞于上奏請逮繫獄雖成然卒無可惜之案各存疑案以待再推迨至十餘載欽遣恤刑往閩及半穀然曰鴆毒之施所以復讐恐即果讐而毒之焉有大設迓宴庶集多人以肆其術之理因訊本紳以宴客之園置自何年曰係購得之非自置也訊以存內亭舍曾葺新否曰仍其舊惟加圬墁而已再訊以花樹亦蔭翳可觀否曰古樹逾圍竹木亦頗叢森更訊以被罪後曾以售他人否曰得

此園即膺稱人咸咎之畏不敢售故雖家業盡
零而此園獨存恤刑隨吁縣令語以夙聞斯園
甲茲邑富即往遂仍為庶諭士民各携餚酒以
示同業更命客具畚鍤待用衆咸莫解所以至
期恤刑携縣令先往吁士民隨之至則啓其園
除辟草莱令士民中有識宴邑令之所者指其
處巍然大廈蘿積重簷蘚陳古砌恤刑曰斯紳
之宽吾得之矣令諸士民各以酒餚雜坐盡飲
至醉以其餘各飲好事者盡令升高併力折毀
於墻垣內得毒虺盈數石若其不經見物則不
訓也恤刑曰砌古則陰沴積陰沴積則苔蘚生
藤蘿附則為蛇虺屈穴之地矣而毒物又多乘
陰氣以遂行若其捕生自春更以氣取宴設至
夜蝇蚋之類必為叢積諸物遂行梁上吸其所
欲而不得逃遂餚中誤以饜之焉
不立斃若非斯園猶存宽何以白

中煤炭毒土炕涸火氣而臭穢者人受薰蒸不覺自
斃其屍軟而傷與夜卧夢魘不能復覺者相似

房中置水一盆併使窗戶有透氣處則煤炭雖臭不能為害

# 律例館校正洗冤録卷四

目録

## 急救方

救溺死　救縊死
救湯火傷　治刃傷
救凍死　救中暑
救中惡　救魘魅
救撲打摔死　救跌壓傷
治蛇蟲傷　治癲狗傷

## 救服毒中毒方

解巴豆毒　解砒霜
解莨菪毒　解鼠莽毒
解斑猫芫青毒　解苦杏仁毒
解胡蔓草　治菌毒

解毒藥　解草烏頭毒
解射罔毒　解輕粉汞斤毒
校服藥　解藥蠱金石毒　治吞金
解煤薰毒　解水銀八耳
解飲鴆毒

治蠱毒及金蠶蠱

辟穢方　辟穢丹

三神湯
蘇合丸方

律例館校正洗冤錄卷四

急救方

救縊死

凡縊從早至夜雖冷亦可救從夜至早稍難若心下温一日以上猶可救不得截繩但緩緩抱解放卧令一人踏其兩肩以手提其髮常令緊不可使頭垂下一人微微撚整喉嚨以手擦胸上散動之一人磨擦臂足屈伸之若已僵但漸漸強屈之又按其腹如此一飯久即氣從口出得吁吸眼開甦醒後又以官桂湯及粥飲與之令潤咽喉更令二人以筆管吹其耳

肉若依此救無不活者

官桂湯

廣陳皮八分　厚朴一錢　肉桂五分

製半夏一錢　乾薑五分　甘草三分

又法緊用手掩其口勿令通氣兩時許氣急即活

又法用皂角細辛等分為末如大豆許吹兩鼻孔

又法用真野山羊血二三分研極細以好酒灌下立活

又法凡男女縊死身雖僵定尚可救活不可割斬繩索抱起解下安放平坦處所仰面朝上頭要扶正先

將手足慢〻申彎然後將大小便用綿軟之物裹緊
不令泄氣用一人坐于頭前兩脚踏其肩揪住頭髮
將縊之人手拉直令喉項通順再用二人將細筆筒
或箸筒入耳内不住口吹氣不住手撫摸其胸前用
活鷄冠血滴入喉鼻之中男左女右男用公鷄女用
母鷄刻下即能甦活如氣絶時久照前救法務要多
吹多摸勿為已冷忽畧不救

救溺死

水溺一宿者尚可救擣皂角以綿裹納下部內須臾出水即活或屈死人兩足著人肩上以死人背貼生人背擔走吐出水即活

又法先打壁泥一堵置地上却以死者仰卧其上更以壁土覆之止露口眼自然水氣翕入泥間其人遂甦雖身僵氣絶用此法亦可救

又法炒熟砂覆死人面上下著砂只留出口鼻砂冷濕又換數易即甦

又醋半盞灌鼻

又綿裡石灰納下部中水出即活

又倒懸以好酒灌鼻中及下部

又倒懸解去衣去臍中垢令兩人以筆管吹其耳

又急解死人衣服於臍上灸百壯

又撈起時急急將口撬音驕開横啣筯一隻使可出水

以竹管吹其兩耳碾生半夏末吹其鼻孔皂角末置

管中吹其穀道如係夏月將溺人肚皮横覆牛背之

上兩邊使人扶住牽牛緩緩行走腹中之水自然淀

口中并大小便流出再用生薑湯化蘇合丸灌之或

生薑汁灌之若無牛以活人覆卧躬要令溺人如前

將肚腹橫覆於活人身上令活人微微動搖水亦可出若一時無牛無活人不肯拯救或鍋一口將溺人覆於鍋上亦可如係冬月急將濕衣解去謂之更換一面炒鹽用布包熨臍一面厚鋪被褥取竈內不著草灰多多鋪於被褥之上令溺人覆卧　上臍下墊以綿　枕一個仍以草灰將渾身厚蓋之灰上再加被褥不可使灰眯於眼內其撬口啣筯灌藥合九生薑湯吹耳鼻穀道等事俱照夏天法冬天甦醒後宜少飲温酒夏天宜少飲粥湯按灰性煖而能拔水凡蠅溺水死者以灰埋之少頃即活此明驗也

又以酒鐔一個紙片一把燒放鐔內急以鐔口覆臍上冷即再燒紙片放鐔內覆脐去水即活

又初救起之時尚有微氣或胸前尚煖速令生人脫貼身裏衣為之更換抱擔身上將屍微微倒側之令其腹內水流出若水往外流即有生機一面用粗紙燎灼取烟薰其鼻竅稍薰片時即用皂角研細吹入鼻竅但得微有一噎噴即可得生

治刃傷

凡殺傷不透膜者乳香沒藥各一皂角子大研爛以小便半盞好酒半盞同煎半温服然後用花蕊石散或烏賊魚骨或龍骨為末敷瘡口上即止昔推官宋琢定驗兩處殺傷氣偶未絶亟令保甲取葱白熱鍋炒熱適敷傷處結而呻吟再易葱白傷者無痛矣

花蕊石散

乳香　沒藥　羌活

紫蘇　蛇含石童便三次煅　草烏

厚朴　白芷　細辛

降香　當歸　南星

輕粉　蘇木　檀香

龍骨各二錢　麝香三分　花蕊石五錢重便煅七次

右共研極細確收聽用葱湯洗淨用此糝之軟綿紙盖扎一日一換神效

又被刃傷血出不止用紫藤香即降香佳者　麞尾鐮刮下石碾碾細敷之血即止又無瘢痕

又刀刃傷痛不可止用好鷄骨炭擲地上鏗然有聲者松香明透者等分搗成一塊再多用老韮菜搗汁拌入陰乾如此拌搗三四遍後為細末收貯上已端

午七夕等日製之敷患處痛立止完好如常

金瘡腸出者用少麥五升水九升煮四升綿濾淨汁待極冷令病人卧蓆上一人含汁噀其背則腸漸入噀時勿令病人知之及多人在傍言語如未入抬蓆四角輕搖則自入既入者須用麻油潤線縫緊仍以潤帛紮束慎勿輕動使瘡口復迸

被箭簇傷者用陳醃肉去皮取紅活美好者用其肥細切剉濃將象牙末及人所退爪甲為末共研極細拌入所剉醃肉內再為勻剉令其合一厚敷箭簇週圍一飯頃其簇即自為迸脫

救湯火傷

湯潑受傷急覓水中大蚌置磁盤中將其口向上置無人處俟其口自開時預將冰片二三分真當門麝二三分同研細末以匙挑一二分傾入蚌口內其口即合而蚌內之肉即化為漿然後入冰麝少許用鵝翎粘掃傷處先從四面邊沿層層掃入痛楚自減如無大蚌小者亦可此急救最驗之第一方也及其大氣已退將用下蚌殼燒灰存性碾細末入冰麝少許從邊圍掃如無蚌處用冰片從四面磨起漸及於中亦可漸瘥

凡被湯火切勿以冷水冷物及井下泥尿泥激之其熱氣遇冷則入之愈深輕者攣縮重則直逼火毒攻心而速之死矣

一法用好杭粉為細末同婦女所用好頭油調塗之如無或栢子油亦可

又法用多年陳醬寬寬塗之但愈後有黑瘢

又用劉奇奴為末先以糯米漿鷄翎掃傷著處後糝藥末并不痛亦並無痕大約湯火著急以鹽末糝之護肉不壞然後用藥敷之至妙

又用生大黃以米醋調敷二日即愈

救中暍

暍死于行路上旋以刀器掘開一穴八水搗之取爛漿以灌死者即活

中暍不省人事者與冷水吃即死但且急取灶間微熱灰壅之復以稍熱湯蘸手巾熨腹脇間良久甦醒不宜便與冷物喫

暑月熱倒急扶在陰凉處切不可與冷水飲當以布巾衣服等蘸熱湯覆脐下及氣海間續以湯淋布帛上令徹臍腹但煖則漸甦也如倉猝無湯處掬道上熱土於脐端以多為佳冷則頻換後與解暑毒藥或

道塗無湯處即掬熱土於臍上仍撥開作窩子令衆人旋溺於其中以代熱湯亦可取效

凡中暑如已迷悶嚼大蒜一大瓣冷水送下如不能嚼即用水研灌之立醒路中倉卒無水渴甚急嚼生葱二寸許和津同嚥可抵飲水二升

中暑暴死以胡麻一升炒黑擣冷為末新汲水調下

救凍死

凍死四肢直口噤有微氣者用大鍋炒灰令煖袋盛熨心上冷即換之候目開以溫酒及清粥稍稍與之若不先溫其心便以火炙則冷氣與火爭必死

又用氈或藁蓆捲之以索繫定放在平穩處令二人相對踏令滾轉往来如扞氈法候四肢温郎活

冬月溺死之人及被凍極之人雖纖毫人事不知但胸前有微温皆可救倘或微笑必為急掩其口鼻如不掩則笑而不止不可救矣切不可驟令近火但一見火則必大笑不可救藥

凡凍死已經救活者宜用生薑帶皮搗碎陳皮捶碎用水三碗煎一碗温服

救魘

魘死不得用燈火照并不得近前急喚但痛咬其足

跟及足大拇趾頻頻吁其名及嚙其面耳灌以薑湯

必活

魘不醒者移動些少卧處徐徐喚之即醒夜間魘者

原有燈即存燈無燈者不可用燈照

又用筆管吹兩耳及取病人頭髮二七莖撚繩刺入

鼻中○又鹽湯灌之

又研韮菜汁半盞灌鼻中冬用根亦可得嚏

又灸兩足大拇趾聚毛中三七壯聚毛乃脚趾向上生毛處

又方皂角末如斗許吹兩鼻內得嚏則氣通三四日

者尚可救

魘死者若身未冷急以酒調蘇合丸灌之即活

救中惡

凡中惡客忤猝死者或先病及睡卧間忽然而絶皆是中惡也用韮黄心於男左女右鼻内刺入六七寸令目開血出即活

視上唇内沿有如粟米粒以針挑破

又用皂角或生半夏末如大豆許吹入兩鼻

又用牛屎燒烟熏鼻中

又綿沉好醋半盞手按令汁入鼻中及捉其兩手勿令驚須臾即活

又炙臍中百壯鼻中吹皂角末或研韮汁灌耳中

又用生菖蒲研取汁一盞灌之

救驚斃

驚怖死者以温酒一兩盞灌之即活

救撲打猝死

五絶及撲打猝死等但須心頭温煖雖經日亦可救

先將死人盤屈在地上如僧打坐狀令一人將死人頭髮控放低用生半夏末以竹筒或紙筒筆管吹在鼻内如活即以生薑自然汁灌之可解半夏毒五絶者謂產魅經魘溺治法單用半夏一味○生薑自然汁用生薑搗爛取汁不用木者是

卒暴墮擲築倒及鬼魘死若肉未冷急以酒調蘇合香丸灌八口若下喉去可活

救跌壓傷

凡跌壓傷重之人口耳出血一時昏暈但視面色尚有生氣身體尚為綿軟則皆可救但不可多人環繞嘈雜驚慌致令驚魂不復急令親人守而扶之坐於地上先拳其兩手兩足緊為抱定少頃再輕移於相呼之人懷中以膝抵其穀道不令洩氣若稍有知覺即移於素所寢處將室內窗櫺遮閉令暗仍拳手足緊抱不可令卧急取童便乘熱灌之馬溺更妙如一

時不可得即人溺亦可要去其頭尾但須未食葱蒜而清利者強灌一二盃下得喉去便好一面用四物湯照原方加三四倍再八桃仁去皮尖及好紅花各一兩全當歸及南山查搗碎各二兩生大黃二兩童便一大鍾如係夏月如黃連四五分多用急流水即在傍用急火煎半熱傾入碗內承於傷者鼻下使藥氣透入腹內則不致入口惡逆乘熱用小鍾強令頓服如其不受則姑緩小刻又進只要陸續灌盡不可使卧服藥之後其穀道尤須用力抵緊不不令其洩氣如藥已行動非至緊不可即解恐其氣泄下洩以

致不救也必俟腹中動而有聲上下往来数遍意不能待方可翼之以解所下盡屬淡紫毒已解半方可令睡至所下盡為糞即停止前藥否則再用二劑亦不碍然後次第調理不可輕用補藥

四物湯

當歸一錢　川芎七分　熟地黄三錢

炒白芍一錢

治蛇虫傷

毒蛇能斃人惟急以利刀割去所噬之死肉可以漸解

蛇傷虫咬倉卒無藥以大藍汁一碗雄黃末二錢調
匀點在所傷處併令細細服其汁如無藍以靛花青
代黑代之

虺蝮傷人其毒内攻即死立將傷處用繩絹紮定勿
使毒入心腹令人口含米醋或燒酒吮傷以吸拔其
毒隨吮隨吐隨換酒醋再吮俟紅淡腫消為度吮者
不可誤嚥中毒又急飲麻油一二盞護心解毒以薑
末敷之

被蝮噬死用香白芷一味以麥冬湯調服急以水代
之飲之即活

又方用五靈指一兩雄黃五錢以酒調灌每服二錢
再以滓塗咬處

治癲狗傷

兼毒未發用斑猫七個去頭足翅淨用鷄蛋二枚同
蒸去斑猫淡食鷄蛋於小便內取下血塊痛脹不解
則血塊未淨仍再食塊盡乃止
又法用斑猫同米炒俟米老黃去斑猫將米研末蒸
鷄蛋食如前法血塊下盡為度
又法受咬後立至溪河將傷處洗擠血淨盡多飲生
薑汁則毒可解仍封紮瘡口勿使受風

救腹毒中毒方

解砒毒

砒霜服下未久者取鷄蛋一二十個打入碗內攪勻八明礬末三錢灌之吐則再灌吐盡更愈但服久砒已入服則不能吐出急用黑鉛四兩重一塊用井水於石上磨出黑汁旋磨旋灌盡則愈即先吐出之後亦宜再用鉛水服之以盡餘毒方無後患

中砒霜毒急取熱鴨血灌之立解又糞清灌之亦解

又方以豆豉濃煎飲之可解

又用甘草汁同藍汁飲之即愈

又用熟豆腐漿灌之亦效

解巴豆毒

中巴豆毒痢不止以大豆一升煑汁飲之

又巴豆畏大黄二連蘆笋筯笋黎蘆各煎冷服皆能止泄

又用芭蕉葉搗自然汁服之即止

解鼠莽毒

黑頭汁可解○又方用枯蓮房殼帶蒂梗陳皮咬咀煎水二三碗灌之如無用荷葉中心蒂或用藕節煎湯一碗温冷灌之毒即散

解萇茗毒

用甘草汁或藍青汁飲之即愈若脈藥即劇

解苦杏仁毒

用杏樹皮煎湯飲之雖迷亂將死者亦可救

解斑猫芫青毒芫音官

用楮膏大豆汁或鹽藍汁服之或用鹽湯煑猪膏巴豆飲之又或用大小黑豆汁服之並瘥用肥皂水灌下再以鵝翎絞喉數次令吐即活

又方用生鷄鴨卵開孔灌入口中連灌五六枚得吐即活倘閉以箸抉開灌入

治菌毒

四明温台間山谷多産菌然種類不一食之間有中毒往往至殺人蓋蛇虺毒氣所薰蒸也有僧教掘地以冷水攪之令獨少頃取飲皆得全活其方自見本草楓樹菌食之笑不止俗言笑菌居山間不可不知此法也

解胡蔓草毒

中胡蔓草毒將糞汁灌之可解或飲浸草毒水百穀潰血急取抱卵不出之鷄蛋研細和麻油開口灌之吐出可救

解毒簟

誤食毒簟至吐即採生金銀花嚼之可解

解草烏頭毒

用飴糖黑豆冷水解之

解射罔毒

用甘草汁或小豆葉浮萍蕎荛汁冷水解之蕎荛又名甜桔梗河南人呼為杏葉汝參能解百藥毒

解輕粉毒

用黑鉛五斤打壺一把盛燒酒十五斤納土茯苓半斤乳香三錢封固重湯煮一日夜埋土中出火毒每

日早晚任飲數盃溺時以瓦盆接之當有粉出服至筋骨不痛乃已○水尼毒飲以新汲冷水可解

救服滷

服鹽滷將常用擦桌布洗水灌之使吐即解

治吞金

中黃金毒者食鵝鴿肉中白銀毒者以黃連甘草解之又洗金以鹽駱駝驢馬脂餘甘子皆能柔金羊脂護子皆能柔金吞金銀入腹中當服食前品柔則易出

又服金者用真輕粉細水調下能令金淀大便出

解藥蠱金石毒

治一切藥毒蠱金石毒用石蟹以熱水磨服

解水銀入耳

以黃金枕耳邊自出若水銀入肉令人筋羣以金物熨之水銀乃出蝕金其病即瘥

解煤薰毒

飲冷水可解或蘿蔔搗汁灌口鼻移向風吹便能醒

解飲饌毒

凡中飲饌毒不知何物即煎甘草薺苨湯飲之便治

治蠱毒及金蜚蠱蠱

泉州一僧能治金蜚蠱蠱毒如中毒者先以白礬末令嘗不澁覺味甘次食黑豆不醒乃中毒也即濃煎石榴皮根飲之下即吐出蟲皆活無不愈者李晦之云凡中毒以白礬芽紫搗為末冷水飲之即愈

保靈丹 治蠱毒諸毒一切藥毒

大山豆根半兩　雄黃　硃砂淨細研一兩

黃藥子　黃栢　麝香

斑猫二錢半去頭足　糯米半生半炒　赤蜈蚣二條一生一炙

川巴豆肥者取肉不去油二錢半　續隨子生杵末二錢半

## 治蠱毒及金蠶蠱蠱

泉州一僧能治金蠶蠱毒如中毒者先以白礬末令嘗不澁覺味甘次食黑豆不醒乃中毒也即濃煎石榴皮根飲之下即吐出蟲皆活無不愈者李晦之云凡中毒以白礬芽茶搗為末冷水飲之即愈

保靈丹（治蠱毒諸毒一切藥毒）

大山豆根（半兩）　雄黃　硃砂（淨細研一兩）

黃藥子　黃栢　鹿茸香

斑猫（二錢半去頭足）　糯米（半生半炒）　赤蜈蚣（二條一生一炙）

川巴豆（肥者取肉不去油二錢半）　續隨子（生杵末二錢半）

右藥八乳鉢研和于端午重陽臘日修合宜避婦人及鷄犬用糯米湯和丸如龍眼核大陰乾磁合收每一丸好茶清吞下不得嚼破須臾毒物下藥九凝血並下以水淨收可救三人

治諸蠱毒用鰻鱺魚乾末空心服之魚或燒炙令香食之其魚有五色文者佳

誌云嶺南俚人解蠱毒畏人知其方乃跪言三百頭牛藥或云三百兩銀藥久共親狎始得其宗所云三百頭牛藥者土常山也三百兩銀藥者馬兜鈴也俱用水煎服即愈

福清縣有訟遭金蠶毒者縣令治之不得蹤或敵謀取兩刺蝟入捕之獲蝟獸類遍身有刺如栗房蓋即山中之刺鼠也金蠶畏蝟亡入其家金蠶不敢動雖匿榻下牆罅盡為兩刺蝟擒出之

## 辟穢方

三神湯

蒼朮二兩米泔浸兩宿焙乾　白朮半兩　甘草半兩炙

右為細末每服二錢八鹽少許點白湯服

辟穢丹能辟穢氣

麝香少許　細辛半兩　甘松一兩　川芎二兩

右為細末蜜圓如彈子大久窨為妙每用一圓燒之

蘇合丸每一丸含化尤能辟惡

犀角屑　丁香　香附

安息香　明天麻　沉香

白术　檀香　木香

畢撥　硃砂　訶子肉

白豆蔻肉　麝香　蘇合油

台烏各二兩　大片腦　乳香各二兩或一兩

黃蠟三十片　蜜六斤或五斤　金箔一百片

右藥一十八味各取淨末煉蜜搗和為丸金箔為衣用蠟作丸裹之或不用蜜丸別以糯米糊搗和印成香佩亦妙


左腮頰
左頰車
左顴骨
左眼眶
左耳竅
左眉稜角
左太陽
左額角
頂
心
頤門
右額角
頭顱
右太陽
右眉稜角
右耳竅
右眼眶
右顴骨
右頰車
右腮頰
骨上下
結喉
左肩井臆骨
左血盆骨
左飯匙骨
左橫觸骨
左脇膊骨
龜子脚骨前二骨
心坎骨
右脇膊骨
右橫觸骨
右飯匙骨
右血盆骨
右肩井臆骨
頷頰骨
齒上下
左肘骨
左臂骨
左髀骨
右肘骨
右髀骨
右臂骨
左手踝
右手踝
左外踝
腕骨連踝
掌骨
大指本節
小節餘指多中節與敵此
右外踝
腕骨連踝
掌骨
大指本節
小節餘指多中節與敵此
左膀前
右膀前
左腿骨
右腿骨
左膝蓋
右膝蓋
左衝骨
右衝骨
踝骨
足背骨
足背骨大指本節與餘中節
足內踝
足跟骨
跗骨
小節
本節
足內踝
足跟骨
跗骨
小節
本節
足內踝
足跟骨
跗骨


額角後
額角後
腦後
左耳根
右耳根
項頭骨五節
乘枕
乘枕
琵琶骨
琵琶骨亦名髀骨
脊骨六節
肋骨即鈌骨左右共二十四條
左臂下俱報前
右臂下俱報前
髖骨
脊骨七節
脾門骨五節
左胯後
右胯後
方骨
尾蛆骨
左腿下俱報前
右腿下俱報前
足外踝
足外踝

檢骨格

正犯

干証

鄰佑左右

屍親

房主

仵作

如法檢得髑髏骨一具問生年

歲

仰面

致命頂心骨

致角 顖門骨

致角 両額角 左右

致角 額顱骨

致角 両太陽穴 左右

致角不 両眉稜骨 左右

致角不 両眼眶骨 左右

致角不 鼻梁骨

致角不 両觀骨 左右

致角不 両顴頰骨 左右

致角不 口骨 上下

不致肉 蔭上下

不致肉 頷頦骨

不致肉 頰車骨左右

不致肉 兩耳竅左右

不致肉 嗉喉結喉骨共四層係脆骨如日甚久亦腐不可檢

不致肉 龜子骨即脊前三骨係排連有左右

不致肉 心坎骨

不致肉 兩肩井臆骨左右

不致肉 兩血盆骨左右

不致肉 兩横髃骨左右

不致命 兩飯匙骨 左右

不致命 兩胎膊骨 左右

不致命 兩肘骨 左右

不致命 兩臂骨 左右

不致命 兩髀骨 左右

不致命 兩手踝 左右

不致命 兩手外踝 左右

不致命 兩腕骨 左右

不致命 兩手掌骨十塊 左右

不致命 兩手十指骨二十八節 左右

不致命 髀骨前 左右

不致命 両腿骨 左右

不致命 両膝蓋骨 左右

不致命 両脛骨 左右

不致命 両骺骨 左右 婦人無

不致命 両足踝 左右

不致命 両足外踝 左右

不致命 両肢骨 左右

不致命 両足掌骨跌骨十塊 左右

不致命 十趾共二十六節 左右

不致
肉
両脚根骨共八堺 左右

合面

致
肉
腦後骨

致
肉
乗枕骨

致
肉
両耳根骨 左右

致
肉
項頸骨第一節

不致
肉
二節

不致
肉
三節

不致
肉
四節

不致
肉
五節

不致肉 尾琶骨亦名髀骨

致肉 脊背骨第一節

不致肉 三節兩旁横出者髖骨

不致肉 三節

不致肉 四節

不致肉 五節

不致肉 六節

致肉 脊膂骨第一節

致肉 二節

不致肉 三節

此以下原唐板亦無或非致肉處故而然

博施良方

○救五絶○　曰自縊○二曰溺水○三曰凍死○四曰墻壓壓○五曰魘魅凡五絶皆以半夏為末冷水為丸如豆大納鼻中溫者可治○又治卒死半夏末如大豆許吹鼻中

凡自縊高懸者徐徐抱住解繩不得斷絶上下安被放倒微微然正喉嚨以手掩其口鼻勿令透氣一人以脚踏其兩肩以手挽其頂髮常令弦急一人以手磨將其胸臆屈伸其手足若以僵直漸漸強屈之一人以脚裹衣抵其糞門勿令泄氣又以竹管吹兩耳候氣從口出呼吸眼開仍引按不住以小薑湯或清粥灌令喉潤能動乃止此法自朝至暮雖已冷可活自暮至朝陰氣盛為難救心下微溫者雖一日可活○一法以半夏末吹鼻中○一治自縊氣脫灸湧泉穴男左女右脚灸三壯○一法男用雄鷄女用鵪鶉刺鷄冠血滴入口中

即活不可將茶水灌

凡溺死者先以刀開溺者口放筋令其芽啣之處之出水又人健夫屈溺人兩足着肩上以背相貼倒拖之而仆令其水出取燥土或壁土置地上將溺者仰卧其上以土覆之止露口眼則自然水氣吸入土中用竹管各於口耳鼻脐糞門內更迭吹之令上下相通又用半夏末搐其鼻又用皂角末綿裹塞糞門須臾出水即活○一方艾灸脐中○一溺死將柳東其人倒放用盐塞臭填滿鹽化即醒及將盐堆脐上

一凍死及冬月落水微有氣者脫去濕衣解活人熱衣包煖用米炒熟盛囊熨心上冷即換之或炒灶灰亦可候身溫煖目開氣回後以溫酒或薑湯粥飲灌之若先將火炙必死○一用牛黃各等分為末點兩眼角

一壓死及墜跌死心頭溫者急扶坐起將手提其髮用半夏末

吹八〻八中少甦以生薑汁同香油打勻灌之次取散血藥服
如無藥〻便灌之○一取東向桃柳枝各七寸煎湯灌下
一中惡魘死〻不得近前呼叫但嗤其面不腥咬脚跟及拇指
略移動徐嗅之原無燈不可用燈待少甦以皂角末吹鼻
凡溺縊魘死急取韭搗汁灌鼻中用皂角末麝香同灌扶捷○
一男子被鬼擊身有青痕作痛者用金銀花二三兩煎湯飲
之極效○一治客忤卒死還魂湯○一麻黃三錢去節杏仁七
十立去皮失甘草一兩水二椀煎半灌之諸卒死通用

安胎催生藥方

凡婦人懷孕三五月感冒寒熱胎動不安及未足月時脈之鄭
安如足月當產脈即產不論體之強弱年之老少皆可○當
歸一錢貝母八分紫蘇六分黃芪八分只角〻分蘄艾三分
黃芩五分白芍一錢甘草二分厚朴五分藿香三分兔絲子

一錢四分右作一貼用白水二椀煎熟熱服一二劑或三五

劑自然快生順產母子兩全但產後不可服

產後胎衣不下用無名異為末三錢即漆匠所用熟油的發子

也以鴨蛋白調勻椀貯次用老末醋一杯熟滚和藥同服其

胎衣即縮如秤鏈樣下來如或不下再服三錢

治胎前產後脐腹作痛服益母丸○益母草不犯鐵八兩當歸

赤芍藥木香各二兩細末煉蜜丸彈子大嚼下一丸湯見下

○胎前脐腹痛胎動不安下血不止用末湯或秦艽當歸煎

湯下○胎前產後脐腹痛寒熱往來狀如瘧朱湯下○臨產

並產後各先用一丸童便八酒下並可催生○又方用益母

草半斤川芎赤芍當歸木香各一兩為末蜜丸梧子大每服

五十丸子酒或童便酒空心服百日有孕其妙如神

異傳不 天花紀驗奇方 天麻子三十粒去殼朱砂一錢膚

香五分先將牛黃麝香細末八天麻子共研成膏五月五日
午時擦小兒項心前心背心兩手兩足心兩臂兩脚灣兩處
共十三處如錢大不可洗去聽其自落本年擦一次出痘
數粒次年端午再擦出痘三粒再次年端午又擦永不出痘
如未過週歲小兒七月七日九月九日依法擦之男女皆同

經驗瘧疾奇方

貝母六兩生半夏四兩極細末右五月五日
午時合和銅鍋微炒至嫩黃待冷入磁瓶勿令泄氣每服一
分五里生薑汁二三匙和藥隔水燉熱在瘧未來先一時服
之即愈者重再服愈後戒發物及南瓜鷄蛋芋芳等二三月

續附經驗救急良方

凡男女心腹絞痛不得吐瀉者名乾霍亂俗名絞腸痧頃更殺
人用滾湯半鍾井水半鍾名陰陽水調白礬末二錢服出
其暑毒或用熱童便將鹽熬調飲亦可更刺委中穴及十指

近甲處刺出血勿與穀食及米飲下咽亦死

凡男子生紅絲疔用針挑斷其絲將多年尿坑石灰泡浸

厌研細用錫糖拌塗在疔上聽疔瘡頭疔即拔出無事

凡八夏月道塗卒倒不省人事者急扶陰涼處掬道上熱土放

脅間撥開作竅令人溺其中後用薑蒜嚼爛以滚水和童便

送下切不可灌涼水外用布蘸滚湯摩心腹脅下

凡人卒中昏倒不省人事牙關緊閉涎潮壅塞急以大指掐人

中俟醒或用半夏末或用皂角細辛菖蒲為末取入鼻中取

嚏如噤不開以白鹽梅蘸于蠶擦之待其少醒用藥治之

凡男女涎潮於心卒然昏倒不省人事即扶入暖室扶策正坐

當面作好醋厌薰之令醋氣沖入口鼻中良久其涎潮聚於

心自收收、輕者即醒重者亦醒人事惟不可喫一滴湯水、

入口、一入湯水則其涎永繫心絡不去必成廢人

凡男[illegible]凡去氣動無氣口閉不通名為尸蹶將菖蒲屑納自入孔中手[illegible]因桂屑放舌下或剔取本人左角髮方寸燒末和熱酒灌之以竹管吹其兩耳

凡小兒初生即不啼奄奄如死急看喉間懸癰前上齶有一泡用指甲摘破急以帛拭恶血勿令下咽○又氣絕不啼急用綿絮抱裹在懷中未可斷脐帶將胞衣置爐炭中燒之燃火紙條蘸油點火於脐帶下薰之蓋脐帶連兒腹薰時有大氣由脐入腹更以熱醋湯盥洗脐帶須臾氣回啼哭方可洗浴斷脐帶○又啼哭不出須看舌下若連舌如石榴子速以指甲摘斷之或用蘆葦刀割之微出血若血出將乱髮灰同猪脂和塗若齒根有黄筋以蘆葦刀割斷點猪乳如口難開先點猪乳初生不少便急用葱白四寸四破之[illegible]兩沸灌下　又大小便不通腹脹欲絕急令婦人以温水軟

口吸哂兒前心後心並脐下手足心以紅赤色為

萬全不傳遲仙丹專治胎前難產

凡產婦累日不下危急將草麻子十四粒去殼明礬一錢半雄黃一錢半研脫一尺燒存性共研細末用漿水飯和丸彈子大先用椒湯淋渫產婦脐下然後將藥一丸放於脐中用紙數重覆以濕帛束之若兒頭生下急取去藥

凡產難用寒水石四兩半生半煆朱砂五錢同研如桃花色每用三分井水調和攤紙上貼脐中候乾再易不過三上即產

凡產婦血暈不成人事用五靈脂二兩半生半炒為末每服一錢白滚湯調下如口噤者扶開灌之入喉即愈

凡有倒產兒尸九出謂逆生不救母子俱亡略令產母仰卧令救生之手足八去一則恐產母驚嚇二則收生者非精白妙手

凡倒產不若用法以三稜針刺兒足心三五用鹽少

許[illegible]生完足以指甲掐之以鹽摩毋腹

凡產後血暈 [illegible]人事不使卧扶坐背後一人擁住用醋炭

炭浸醋中[illegible]之使醋氣入鼻中再用花蕊石末一錢童便調

下如口噤扶開灌之 又以五靈脂二兩半生半炒溫酒調

下二錢口噤扶開灌之 一方以真鬱金燒存性為末二錢

用醋一合調灌 一方半夏末冷水和丸如大豆大納鼻中

凡產婦中風不省人事口吐涎沫手足瘛瘲當敢身剉斧等分

為末每服二錢水一盞酒少許童便少許煎七分灌之

誤傷救急

凡人被墻頭壓死心頭溫者將身盤坐緊提其髮用半夏末吹

鼻取嚏以麻油和薑汁灌之少頃即醒

凡人或跌或打傷損不食生猪肉乱搗溫水和一[illegible]自然合

凡人或跌[illegible]打脇破腸出急以油抹入煎人蓼枸杞汁淋之連

食羊腎十日愈或以冷水噴其面更妙

凡人刀斧傷指甚者將藤木末數用蠶繭裹數日自愈

一切中毒救急良方

中砒霜毒刺沽羊血服　或飲宿糞水　或擣烏桕樹根汁服　或擣綠豆汁服　或用降香末四兩濃煎服　中蓋滷毒縱飲生豆腐漿　中河豚毒胡麻油大豆汁橄欖汁並可解　中白果毒將木香滚水磨汁八麝香少許服或將白果殼爛擣煎服　中鉛粉毒以麻油調蜂蜜如飴糖與服　中水銀毒以炭末煎汁解之　誤食金銀器將陳大麥去芒刺炒黑作粉用黃糖小許拌食一日二次每服一盞三四日即解下獨可粥飯大葷不可喫湯水　又誤吞針者煎蠶豆自下　被人咬傷若牙黃入內不出立成痼疾用人糞浸二三日許待其牙黃毒出然後以龜板灸炙用

之[illegible]　[illegible]　木傷處上下緊縛使毒不散走隨浸囊上
九食蒜食令飽使毒不攻心又方將貝母為末酒調至[illegible]
頃久酒涎[illegible]處化水流出候水盡以艾圓灸之

預防疾病要訣

凡人於三四月間有喉間病者皆因寒天寒氣鬱結不開至春
始發須於初交冬時多以蘿蔔攤在屋瓦上任他日晒風吹
雨雪霜打不要收下直到立春上一日收下將或竹或繩掛
在陰處春二三月收來切碎將醬或鹽放在橈中飯鍋上蒸
熟當日日喫飯小茱甚效永無喉間之患或研細末調下
[illegible]通萬應丹能治山嵐瘴氣痧發灶疼等症居家出行俱宜常
佩遇病者只用三九翁下　蒼朮米泔浸切片　烘乾為末三
兩丁香六錢　麻切片焙乾為末三兩六錢　黃[illegible]
為末六　麻黃去節細剉焙為末三兩六錢真蟬殼九錢子

燒酒浸〻麝香為末三錢甘草微炒為末二兩四錢雄黃研
細水飛三兩〻錢朱砂研細水飛三兩六味〻
糯米粥漿和之丸如蘿蔔子用朱砂為衣使飲